長壽

于右任

中華郵政特准掛號認為新聞紙類

每份四分　第一〇八期

中華民國廿三年六月廿九日

每逢星期五出版全年五十期連郵二元國外加倍

館址上海三馬路雲南路口幸福書局內

本期目錄

哺乳與梅毒
關於體溫之常識
痧子之特效藥
異物入五官之急救法
活屋
吐血奇驗方
用藥指南
婦科雜談
女生之脚癢風潮
一個腹部透明能見肺腑的嬰孩
陰戶生蝨之自療
論大麻瘋證治
房事禁忌一覽表
藥品之功用
急慢驚風之辨別
治小兒雪口
血臟治驗
腹痛自療法

哺乳與梅毒

鳳

世之不能自制情欲者。每易沾梅毒。及其他之花柳病。此為咎由自取。然無辜之人如乳媼者。來自田間。初無惡疾。有因受傭以致染毒。可嘆息哉。余曾見某家之乳媼。因育一嬰。此嬰適罹遺傳性梅毒。提攜甫二月。而乳頭潰爛。旋發生梅毒症狀。嗚呼。所得之乳金幾微。而所受之疾病奇酷。余因素知該兒之父母。俱有隱疾。其子發現遺傳性梅毒。故余對此無辜之乳媼。愀然不能釋。悲憫之而無可慰藉之。蓋所悲者非僅悲一乳媼。乃復悲乘乳兒。與乳媼之家屬也。受病之乳媼。若易主而傭。則又將波及無辜之嬰兒。及一二年後。其乳汁之分泌漸寡。必告退回里。則又將介紹此病於其夫。其轉輾傳染可怖孰甚焉。

友人某。嘗見已染梅毒之乳媼。雇於人。而其主所育之嬰兒。因之亦得斯疾。至於哺乳可傳之病。豈僅小兒所患之急性傳染症。大半可因乳媼傳遞者。小兒因病夭殤之後。其乳媼恒即日再往荐傭之家。覓新主顧。誰復詢其來歷。而其攜帶傳染症也。速於置郵矣。

昔年。余有一兒。雇媼乳之。二十日後。發天花。媼謂余曰。外間盛傳天花。吾前主之家。嬰兒先染此病云云。則吾家之天花。殆彼乳媼所攜來者。可不懼乎。

余之云主張康健家庭之小孩。宜哺母乳。八個月而易以相當之牛乳。或牛乳粉。設其母不能自哺。與其雇不健全之乳媼。甯飲牛乳。但牛乳須改造其成分。使與人乳相似。至有梅毒之家庭。宜及早治療。苟有嬰兒。不宜雇乳媼。而宜飲母乳。或喂以配置合度之牛乳。母之攖毒病者。宜於哺乳時。常服治毒之藥。使乳汁中。亦含藥性。則嬰兒之存遺毒者。亦可得益也。

上海新新公司常年醫藥顧問

上海世界書局常年醫藥顧問

診例

(甲)門診一元
(乙)出診四元
(丙)[illegible]
(丁)外埠問病二元
(戊)急病隨請隨到

號金不取　路遠遞加　隔日取件　原班回件

時間　門診上午八時至下午四時止出診四時以後

電話九一四九二

診所　上海[illegible]

號　[illegible]啓

吐血奇驗方

唐湘清

昔年。余表舅父陡患吐血，偏延中西名醫服藥，皆如石投海，毫不見効。後病勢日重，幾將不治，但仍不肯捨其不治，乃乘船往虛勞專科處就診，在船中有一人述及吐血單方，方用純白蠶豆花(有微黑點者忌用)泡湯而服。後余表舅父等回家後，乃照方服之，果見奇效。民國十四年余就學於高小時，敎師孫賓鏞先生，亦患吐血，未到校已久，愈後來校，已精神飽滿，毫無病狀。詢其何以治愈；彼謂白蠶豆花而愈也；今春間診得一吐血病人，曆用白芨阿膠仙鶴，等無效。余乃勸以白蠶豆花泡湯而服；服後兩日吐血即止，現已健康如常矣。由此則益信，白蠶豆花治吐血，乃無上之靈驗方也：

用藥指南

朱振聲

(七十三)姜黃（辛溫而苦入肝與脾）

◻破血下氣　脾胃有寒則氣滯。陽氣不行則血鬱。姜黃氣味辛溫。能鼓動脾陽。散其寒氣。陽振寒去。氣血自通。

◻散腫消癰　腫之來由甚多。或虛腫。或水腫。或風腫。或濕腫。或肺氣不通而腫。或腎寒經水上逆而腫。要之俱由脾陽不振。寒水之氣不化所致。姜黃辛溫。能通脾陽。脾土寒水自化。土能制水。腫症自散。癰為陽症。因氣血不和。毒氣泛肌肉而生。姜黃辛溫之品。亦屬陽藥。陽症用陽藥。恐不能受益。而反招損也。若陰邪之濕疽。或以辛溫能散濕邪之義。用之則宜。

◻除風可也　風寒鬱於經絡。則四肢疼痛。手足不舉。姜黃苦辛溫。能散經絡之風寒濕。辛制風。苦燥濕。溫散寒。此只言風者。風為百病之長。風去。寒濕亦除也。

◻氣脹宜之　腫屬於脾。脹屬于肝。腫必兼脹。脹不兼腫。脹由肝木橫行。故名氣脹。姜黃辛溫。入於肝經。故可治之。

婦科雜談

葉勁秋

血枯—補養{補水—補火—補中氣}—補脾和胃

{五補丸。衛生湯。
六味丸。八味丸。
補中益氣湯。歸脾湯。}

乾枯—大補氣血。

孟英曰。補水勿泥於六味。補中氣勿泥於歸脾。

葉氏治法{(一)調奇經。(二)調肝。(三)脾胃。}

寇宗奭曰。童年情竇早開。積想在心。月水先閉。蓋憂愁思慮則傷心。心傷則血耗竭。故經水閉也。火既受病。不能榮養其子。故不嗜食。脾既虛。則金氣虧。故發嗽。嗽既作。則水氣竭。故四肢乾。木氣不充。故多怒。髮鬢焦筋痿。五臟以次傳遍。故本不死。然終死也。所以諸勞。最為難治。

堯封曰。此證所願不得。相火必熾。非補水無以制之。六味地黃湯。補陰瀉陽。固是妙法。然脾虛食減。倘嫌地黃泥膈。炒枯可也。不然以女貞易之。顧名思義。幷瀉相火。

孟英曰。此症最難治。六味礙脾。歸脾助火。惟薛一瓢滋營養液膏。加小麥大棗遠志。庶幾合法。一瓢又有心脾雙補丸。亦可酌用。又經水固以月行為常。然陰虛者多火。經每先期。陰愈虛。行愈速。甚至旬日半月而一行。更有。血已無多。而猶每月竭蹶一行者。其涸也。可立而待也。若血雖虛而火不甚熾。汛不必愆期。此含蓄有權。雖停止一二年。或竟斷絕不行。但其脈不甚數者。正合坤主吝嗇之道。皆可無慮。昧者不知此理。而但憑月事以分病之輕重。聞其不行輒欲通之。竭澤而漁。不仁甚矣。

——未完——

關於體溫之常識

吳濱濤

吾人身體，普通保持着一定的溫度，便是體溫。檢查體溫所用的溫度表，稱爲體溫計。普通健康人的體溫，是在攝氏體溫計三十六度至三十七度之間：小兒的體溫，約較此稍高，其平均爲三十七度五分：若七十歲以上的老人，其體溫約爲三十六度。以上所言的，都是健康體溫。能保持此一定的健康體溫，在健康未被破壞以先，是永久不會變的。健康體溫，常因種種原因，而有很微的增減，例如清晨的時候，體溫略低；而在午後則略高。又若神經的與奮。及飲食之後。均能增高體溫。所以健康體溫雖不免稍有增減：但其增減之度數，是不超過一度的。倘若發現體溫，逐漸的減低，覺達於三十六度以下時：或發現體溫逐漸的增高了，已被破壞，而呈病的狀態。體溫若在三十七度以上，稱爲發熱。以發熱的程度，而別爲六種：

亞熱——自三十七度，至三十八度之間。

輕熱——自三十八度，至三十八度四分之間。

中熱——早晨自三十八度五分，至三十九度；在晚間則更增至三十九度五分。

高熱——早晨三十九度五分，在晚間則增至四十度五分。

最高熱——早晨在三十九度五分以上，晚間亦超過四十度五分。

臨死熱——體升至四十二度以上，或下降至三十三度以下，往往取死的轉歸。

檢查體溫的時候，先將體溫計，用手緊握而振盪之，使水銀指針，降落。於是插入腋下，使被檢者，以臂緊夾之。大約十分鐘至十五分鐘，即可將體溫計取出，而視察體溫計上所指示之體溫度數。倘若液下有汗液，則當在先拭乾，自不待言。檢查體溫之部位，雖以在液下爲普通：然在必要時，亦可由口腔，股間，肛門，或膣中等部位檢查之。

檢查體溫的次數，通常以每日三次爲原則：在早晨七時頃一次。午後三時頃一次，及夜間九時頃一次。若有必要的時候，亦可增減檢查驗溫的次數，較爲妥當。

發熱的狀態之不同，即熱型之不同，有如下列之所示：

一、在早晨與晚間之熱，相差在一度以內的，概爲稽留熱。如傷寒，肺炎等，均是稽留熱。

二、熱度之早間與晚間，相差在一度以上，二度以內者，即稱爲弛張熱。如敗血症，膿瘍等，均發弛張熱。

三、在早晨爲平溫，（即康健體溫，三十七度左右。）但至晚間，則升至三十九度乃至四十度者，謂之消耗熱。肺癆其例之一。

四、假如發熱是隔日而發作的。不發熱之時，其體溫爲常溫，稱爲間歇熱。瘧疾，即是此種熱型。

五、間歇熱，與稽留熱，相互混雜的熱型，稱爲回歸熱。例如回歸熱病。在中國則甚少見的。

痧子特效藥

葉橘泉

痧子係一種傳染性流行熱病。患者初起似傷風。咳嗽。噴嚏。流淚。畏寒發熱。在小兒間發驚搐。繼即皮膚發現紅色疹點。先發於顏面。而胸次。而四肢。順序暢達者。爲順。若先發四肢。或胸次。或須面不達者。或初現即穩沒不見者爲逆爲險。蓋本病是感染一種病原細菌。（病原菌之形狀尚未查見混入血液中。由體溫之抵抗而達於皮膚毛細血管。至發現爲紅色之疹。則病毒可消滅。而體功免疫之機能方告勝利。此病在我國舊學說。雖不知病原體之爲何物。然亦以經驗所知。祇求疹點暢達而後爲病愈。因此民間。咸知痧疹以早透爲快。最怕透不出復沒之症。用稽古相傳之民間單方『西湖柳』煎湯內服。透疹發汗解熱。不但有效。而且合於學理。在舊醫與民衆雖知其效。而數數用之。屢屢驗之。但仍不知其所然。

考西湖柳一名河柳。即垂絲。爲柳科水楊柳屬之一種細葉柳。係落葉亞喬木。多生於原野水邊。或栽植於河岸。樹皮色紅褐。枝皮色青而平滑背有茸毛。春日先葉而花。花綠。雄蕊則密生絮狀之白毛。本品之葉及稍皮。在歐洲古時作規那皮之代用品。其味苦。氣稍芳香。其有效成分爲『水楊酸』。能發汗解熱。即製造『阿斯匹林』及『霹靂米同』等之原料。一般頭腦陳舊之中醫。視阿斯匹林爲怪藥。而深迷洋化之西醫。罵中醫藥學爲無用。此實兩方腦膜之故也。

幸福書局出版醫藥新書

地址上海三馬路雲南路轉角

婦女病 全書二冊 實售一元 外埠函購寄費一角

求孕與避孕 全書二冊 實售一元 外埠函購寄費一角

腎病研究 全書二冊 實售一元 外埠函購寄費一角

百病秘方 全書二冊 實售九角 外埠函購寄費一角

保腦新書 全書一冊 實售四角 外埠函購寄費九分

胎產問題 全書一冊 實售四角 外埠函購寄費九分

異物入五官之急救法

克儉

(乙)耳內異物。異物入耳內。有兩種原因。一爲患神經病之小孩。或愛玩之小孩。以豆米砂石等物。置於耳外。在不知不覺間。遂墮入聽道內部。一爲當睡眠之際。蚊蚤木虱小蟲。進入耳內。此兩師爲臨床上最多見者。其他又有在取耳時。因傷所結之痂。與耳垢。聚積之結成一塊硬物。以不易取出。遂存留於耳內。其救急方法。以異物之種類而異。若係蟲類進入耳內。在其未死以前。決不可用器械亂摘。因恐不見捉獲。反而逐之入於深部。則更難爲計矣。此時最好以甘油滴入耳內。蟲類一遇油類。則失其運動能力。然後再用器械摘出之。或滴甘油於耳內。俟其死後。以微溫水注入耳內。流出之。（如無甘油。香油亦可用）若係細小之砂石塵土等物。亦以微溫水注入耳內。異物可隨水流出。若係果實豆類等異物。則不宜灌水入耳。因恐其遇水即膨脹。反而難以取出也。此時可將患耳向下。健耳向上。以手牽動患耳耳殼。同時將頭左右擺搖。如是則果實豆類等物自然落下。因其質堅而形圓。易於下墮也。若係耳垢。則先以甘油滴入耳內。使其軟化。再以器械摘出之。

(丙)喉頭異物。喉頭內異物。以飯粒及茶水爲多。常見於飲食時談笑。或咳嗽患者。因一時不慎。遂將飯粒或水逼入於喉頭內。此時患者立即發生咳嗽。呼吸有極不快之感。其救急方法。司令患者用大力咳嗽。以咳出之。如茶水誤入喉內。司令患者倒懸。以流出之。同時患者亦用大力咳嗽。至水排盡後而止。至於其他異物。如魚骨雞骨豆類等物。嵌於喉頭。即咳嗽亦無法除去時。則須速專門醫生用手術摘出。若俟喉頭發生炎症。一旦呼吸障礙。或窒息發作。則恐有生命之危險矣。

(丁)咽頭內異物。咽頭內異物。以魚骨雞骨爲多。以食魚或食雞時摘骨不盡。誤而咽下。遂刺咽頭上。其救急方法。令患者張大其口。以箸子壓平其舌。同時令患者呼氣。細察骨之所在處。以患子攝出之。如視察不見骨之所在。則必係刺於食道內。此時則非平常人所能取出。以速到醫生處設法爲宜，至於吾國古法。以飯或麵包一大團。用力咽下。使刺於咽頭之骨。隨之下咽。而入於胃。亦能治愈者。但以學理上思之。此法以不用爲宜。因魚骨及雞骨。既可刺入於咽頭或食道。則必尖利無疑。今將此尖利之骨。又復咽入胃內。由胃入腸。則難免不再刺於胃腸上也。

(戊)鼻內異物。鼻內異物有自鼻孔送入者。此多見於愛玩的小孩。有自喉頭逼入鼻腔者。則多見於食物時之談笑。或咳嗽。其救急方法。可以細軟之物。送入鼻腔內。刺戟鼻粘膜。使之嚏噴發作。此時則異物自可排出矣。如異物過大用前法不能排出時。則以手之姆指塞於健側鼻孔。並閉其口。此時患者用力向外噴氣。使氣將鼻內異物逼出。如此者反復行之。至異物排出爲止。（完）

家庭醫學

活屋（九）

（藝庵譯）

(二)運動之間。必要適宜之休息　於此休息之間。可使筋肉細胞恢復其原態　送滋養分中使盡之廢物於他處。更取新造之滋養分也。

(三)運動時心中宜快樂　中心抑鬱。終日憂思。其人雖自朝至暮運動不絕。決不能爲健康之助。譬乎婦人。心中快樂。踴躍以勵家事。則身體必强。否則雖終日洒掃。洗衣滌器營營不息。亦徒勞無功耳。彼富貴家之女子。不知家庭運動爲何事。故動輒生病。孱弱無力。雖終歲醫藥不絕。亦何裨於事實哉。

(四)運動必全身均匀　唯甲肉運動。而乙肉不運動。則唯甲肉發達。而全身不與之相稱格拉特思登氏。曾發見倫敦平坦之路所行之馬。與昇降於鄉村山阪之馬相比。壽命遠不及鄉村之馬。此即因平坦路上所行之馬。其肉祇　部分發達。全身筋肉。與不運動相等故也。

(五)欲强壯筋肉。必有相當之滋養物　大麥小麥荳類胡桃野栗菓物牛乳米等。皆爲筋之滋養物。甘味果物中之糖分。亦發達筋肉之至良劑也。然無論何種食物。苟食之過度。亦無益而有損。徒食而不運動。則徒多脂肪而轉弱筋肉之力。

血臓治驗

魏小泉

甯國李雲門太守。患少腹脹大。肢體盡腫。兩脅刺痛。吐瘀多至盈碗。凡理氣行水之藥。均遍嘗不效。羣醫以此病難治。皆相率辭去。其幕僚趙君與予善。因薦予往診。予思昔賢論腫脹之因。有氣血寒熱痰濕蟲積之不同。若腫脹腹大。而又脅痛吐瘀者。其爲血臓無疑。予即用歸尾桃紅乳沒旋覆鬱金之屬。以通絡消瘀。服兩帖。於止痛平。仍依前法增損。再服十餘帖。而腫脹盡消。夫醫者臨症。能辨明病因。則施治自可獲效。如辨因不煎。則藥不中病。未見有能治愈者。如李太守血臓之類是也。

萬有醫庫

朱振聲編　不日出版

腹痛自療法（九）

長篇專著　朱振聲

杭白芍錢半酒炒　醋炒香附二錢　煅磁石三錢
阿膠珠三錢　川楝子錢半　炒川雅連三分
石決明四錢　硃茯苓三錢　潼白蒺藜鹽水炒各錢半

二診　腹痛已止。眩暈亦減。然心中時仍跳蕩。蕩則神覺昏糊。還是肝陽撼擾。再甯神和陽養肝。

阿膠珠二錢　杭白芍錢半　茯　神三錢
煅龍骨三錢　大生地四錢　炒棗仁研二錢
生牡蠣五錢　塊辰砂三錢　鈎鈎後入三錢
金器一件懸煎

（十三）腹痛神疲愈發愈密

素有腹痛患。投溫劑而稍效。現在愈發愈密。胸次不舒。胃減便閉。脈軟神倦。此屬肝鬱滯。下元命火失化也。治宜溫潤之法。

理中湯加　當　歸　蓯　蓉

（十四）腹痛拒按自汗如雨

脾腎之陽素虧。醉飽之日偏多。腹痛拒按。自汗如雨。大便三日未行。舌垢膩。脈沈實。濕痰食滯。團結於內。非下不通。而涉及陽虛之體。又非溫不動。許學士溫下之法。原從仲聖大實痛之例化出。今當宗之。

製附子八分　肉　桂三分　生大黃三錢
乾　薑五分　枳　實三錢　厚　朴一錢

（十五）手心發熱腹中脹痛

投異功散。胃納較起。而手心發熱。腹中痛脹。大便時結時溏。脈細數而弦。舌紅無苔。陰分不足。肝失所養。木旺剋土脾氣少運。再扶氣陰以和肝脾。

吉林鬚三錢　石　斛三錢　蒿　梗二錢
雲茯苓三錢　於　朮二錢　香　附二錢
扁豆衣三錢　陳　皮一錢　白　芍二錢
焦甘草一錢　炙蒺藜三錢　穀　芽三錢
荷　蒂五個　紅　棗七枚

介紹 國醫奚昇初

武進奚昇初先生戴溪名家業醫三代尤精幼科行道垂二十年常錫宜溧一帶聲名籍甚茲値薄遊海濱同人等堅勸懸壺以廣仁術爲訂診例如後

主治　內科幼科
門診　上午十時至下午二時止診金一元二角特號加倍
出診　下午四時以後診金五元六角早晚加倍遠道遞加
診所　廈門路尊德里二十三號電話九〇七四二號

吳鐵城　焦易堂　陳立夫　杜月笙　王曉籟　王延松仝啓

贈送家庭實用驗方

附郵五分即寄一冊

喉痛經驗方　咳嗽簡效方　咳血自療法　[illegible]　[illegible]外治法　橫痃內治法　瘰癧自療法　不寐神效方　泄瀉自療法
痔漏自療法　痔瘡便血方　乳少增多法　[illegible]　立止[illegible]法　痢疾簡效方　便秘簡效方　紅眼睛治法　耳鳴經驗方
耳疳簡效方　通利小便方　肺癰簡治法　[illegible]效方　水腫經驗方　陽痿自療法　橫痃外治法　楊梅瘡驗方　老白濁驗方
新白濁驗方　夢遺自療法　腎虧療治法　[illegible]療法　遺尿自療法　單腹脹驗方　牙痛外治法　凍瘡自療法　雞眼自療法
下疳經驗方　口臭自療法　戒烟簡便法　[illegible]方　安胎神效方　通經最良方　經漏不止方　血崩不止方　種子簡效方
白暈急救法　氣塊外治法　乳[illegible]外治法　[illegible]方　[illegible]方　血滯簡效方　赤帶簡效方　肝氣簡效方　乳癰簡效方
難產催生方　預防小產方　女子[illegible]方　[illegible]　[illegible]　[illegible]方　解救[illegible]胎方　產後血塊方　惡阻簡治法

上海三馬路雲南路轉角幸福書局發行

女生之脚癢風潮

金陵大學

羞人答答　蹺起雙足　任憑醫生擺佈　校中遍貼標語

鎮靜的南京城。日來給日副領藏本串演隱身術。扒上鍾山巔蜷伏獸洞。俯瞰秦淮燈火。日鬧得憲警大捉迷藏。日方紛遣軍艦。惶惶終日。轟動中外。現在一波已平。一波又興。消息傳來。金陵大學女生患普遍脚癢病。一時闔校娘兒。心癢難搔。連叫苦也。校長教員們對此意想不到的奇疾。也啼笑皆非。『奇事年年有。何殊今歲多』。茲將脚癢趣聞。紀告讀本報者。

△癢的原因　男女某部的器官雖異。但足趾搆造相同。淋巴管線分泌出來的一重液質。除了嗜痂癖者愛聞。說可提神醒腦外。其他都因『臭而不可聞也』敬謝不敏。女子愛潔天性，金陵女生皇后化。是更疾臭如仇。所以天天洗足。並因踝足才顯健美。一個個不着襪子姑娘。穿了橡皮鞋。跳跳躍躍。豈知橡皮鞋最富濕氣。女子好動。打捧球擲籃球。鞋腔內好似淋了雨點。大家不知不覺。日積月累。足趾間便發奇癢了。

△談虎色變　最先有沈姓女生覺得足趾奇癢。轉告同學。竟同病相憐。沒有三日。全校三分之一生衆。齊向舍監訴苦。說坐臥不安。其癢難熬。年幼女生更淚水汪汪。『癢癢癢』洋洋盈耳。莫不談虎色變。

△處治辦法　脚癢風潮發生後的明天。該校長便延中央醫院皮膚科劉主任率助手六人來校診治。敷止癢油藥。各女生羞人答答。蹺起了雙足。一任醫師擺佈。最妙的。女生中有呼『癢來……癢來』。醫師亦爲莞爾。一面又舉行清潔運動。由庶務主任督領校役從事。忙忙碌碌停課二日。

△奇妙標語　學校當局。循新生活運動例。於臥室敎室膳廳走廊壁柱上。分貼紅綠標語。如『新生活運動注重康健』。『脚不康健。是一大缺陷』。『要你脚上濕氣快快好。就得常上山上跑』。『自己脚癢已苦惱。不要傳染別人』。『女子最怕癢。得了脚癢頂可惡』。語句頗特別。奇妙之至。閱後耐人尋味也。

信不信由你

一個腹部透明能見肺腑的嬰孩

長沙東鄉瀛林橋敦家屋。遜清兵刑部鄭恪愼公之曾孫媳。於去年臘月。遺產雙胎。其中一胎與常兒無異。但同產之另一胎兒。其腹部如玻璃之透明。具見臟腑。儼如使用X光然。每一啼哭。則見其肝肺擴張。狀極可怖。但該兒除具此唯一畸形外。其餘哺乳睡眠等。則與常兒無異。後該兒不知感患何症。未半月即行夭去。（其同產之一孩則尙存在）特誌之。以供生理家之究研云。

（記者按）鄭恪愼公之曾孫媳。乃長沙名醫鄭謙先生之從嫂。此事即鄭先生親口談及。絕非虛搆。但該孩夭去後。未能將其屍體保存。聊供生理學家作精密之研究。該家人乃將其掩瘞。致大可研究之畸形生理標本。與草木同腐。殊爲可惜。

陰戶生蝨之自療

宋愛人

（原因）此證完全繇於不潔而來。如月事後不加洗滌。至瘀血惡物。膠粘於陰唇夾縫中。日積久之。腐穢生蟲。又有慾後不洗。又有帶濁不淨。然總不越於不潔中來也。

（證狀）陰阜叢毛之間。發現含有生活狀態之寄生小蟲。形如花蜘蛛而極小。叮啄於陰毛之上。蟲起疙瘩。或紅或白。搔癢難堪。抓破色紅。中含黑點。

（治法）先宜從事清潔。時時勤洗。再以各種驗方治之如後。

（一）百部。浸入燒酒內。頻頻擦拭。即瘉。或以生白果。搗爛。塗瘢。亦有特效。或取古代銅鏡。水摩取汁。塗拭患處。更有效也。

（二）又有薰取陰蝨一法。頗佳。法取銀硃紙。燒烟薰之。日三四次。可瘉。製銀硃紙法。銀砂一錢。火紙捲作七條。燒烟薰之。燻法。燃着紙條。不使起焰。微將烟頭吹向陰戶。蝨受薰。可以盡死。若毛際肉內。如豆如餅。而發奇痒。結痂如臘皮者。此爲陽梅毒。治法另詳。

◎論大麻瘋證治

何振先

大麻瘋為一難治之痼疾。閩廣之地卑濕。故易患之。且為特有之病。多因氣血損傷。腠理不密。或醉後房勞沐浴。或登山涉水。外邪侵入。以致衛氣相搏。濕熱相併。血隨火化。而成斯疾也。毒傳五藏。見症各異。眉毛先落者。毒在肺也。面發紫泡者。毒在肝也。目先損者。毒在心也。遍身如癬者。毒在脾也。脚底先痛或穿者。毒在腎也。病從頭面起者為順。從足心起者為逆。其麻木不仁者皮死、針刺不痛者肉死。潰爛者血死。指脫者筋死。鼻柱壞者骨死、脈沈病在上。脈浮病在下。以上略言本證之辨別法也。一經患之。備嘗痛苦、而又不即死、實為可憫。至於治法、世雖有所傳。率皆不能收成效。今得一方。法易而效驗。方用到處皆有之草。（草名蒼耳草）以草煮水。以水熬膏。即病至眉毛盡落。面如火燒。損及骨節者。服此膏後。亦不過兩月即能見效。愈後一如常人，茲將方錄下。以公於世。世之患者。不妨一試。俾得早復康強。是所至望矣。

熬膏方法：將蒼耳草五斤。切成二寸長。放一銅鍋內。將淨河水加滿、連煮六時。榨取淨汁、再將汁熬六時成膏。約重九兩為止、用有蓋磁瓶收貯。但熬時須用小濾器將沫濾盡。否則天熱生霉。此草須在小暑後。立秋前採取。方有效。因秋前此草梗中有蟲。秋後即鑽出。故無用也、世草滿身皆刺。熬除根下鬚不用外。餘俱可用。

膏服法：患在上部者飯後服。在下部者飯前服。每服一匙。日服三次。但服後須忌食猪肉。依法行之。自有奇效。（完）

房事禁忌一覽表（唐湘清）

禁忌時期	犯後結果
冬季	春則病溫
經期內	必起子宮內膜炎或患膣加答兒等症
有孕後	必致流產或難產且慾火傷胎使兒發生胎毒
產後兩月內	產婦必患全身貧血子宮後屈轉位或致腰痛不能復直乳汁全無終身病弱患害非淺
女子天癸始至	陰氣早泄必致夭壽
童子時代	精血未足五臟未充犯之必有難狀之疾
赤目	必成內障
小兒疾病期內	房事被褥掀動每有「被頭風」襲人着於病兒
病後	變證復發
恐懼	陰陽必偏虛
忿怒	大怒傷肝犯之必病
酒醉後	醉中製造之小兒長成後必多癲癇白痴及種種精神病
空腹時	犯則傷元神
遠行後	百里行房者死
男子忍小便時	成淋症

神效包皮自療藥膏

一夜全愈　不用刀割

包皮之內易藏污垢臭穢難堪有礙發育其害可知本主人曾患此病深受痛苦幸研究一藥得免痛苦一夜即能治愈不用刀割毫無痛苦本人不敢自祕製藥問世以濟同病每料只取一元郵票通用寄費加一再

敬送　腎病秘方專治遺精早洩見色流精有藥到病除之功函索即寄

蛟川別墅　卡德路龍雲里內　電話三〇九四五號

分銷處　六馬路百靈藥社

幸福書局代售各種良藥

地址　上海三馬路雲南路轉角

遺精敵　有夢而遺　無夢而洩　久患新起　服之如神　每盒大洋一元

保腦丸　用腦過度　鼻流濁涕　腥臭異常　一服即愈　每盒大洋五角

白濁丸　白濁初起　溺管刺痛　止濁定痛　效如桴鼓　每盒大洋一元

吐血靈丹　肝火犯肺　肺絡損傷　痰紅吐血　服之立止　每盒大洋五角

獺肝定痛散　女子善鬱　肝病時發　[illegible]　定痛靈驗無比　每盒大洋四角

菓品之功用

仁

凡一切菓品。如橘梨等類。人知有解渴生津之功用外。餘多作消遣品。其於醫藥上之功用。反湮沒無聞。爰集普通菓品十數種。一一述明其價值。以彰其功。

（柿）涼血。乾者潤肺開胃。能治吐血下血。熱淋澀痛。反胃吐食諸證。其蒂與丁香生薑同用。可治呃逆。

（橘）開胃止渴。橘皮能散。能和。化痰。順氣。理中。調脾。快膈。其核乃療疝氣要藥。與杜仲同用。治腰痛。

（枇杷）解渴疾。治肺熱症。婦人產後口乾。食之最宜。其葉可治咳嗽。

（楊梅）消食下酒。多食則損齒。灸灰末服。治下痢。

（櫻桃）蛇咬。打汁飲。以渣敷傷處。若浸於高粱酒內。可治凍瘃之未潰者。

（白菓）性濇。取其肉搗爛。豆腐漿冲服。治白濁。陳年油浸白菓。可療肺病。

（胡桃）其肉潤肌黑髮。服時。須漸漸食。初食服一顆。每五日加一顆。至二十顆止。周而復始。久之。則骨肉細膩光潤。鬚髮黑澤。血脈通潤。

（荔枝）止煩渴。能解口臭。其核治疝氣。

（橄欖）治喉痛。解煤毒。又解河豚毒。

（柚子）切片。清水煎。加糖。可解酒醒。

（藕）產食生津止渴。切碎濃煎湯飲。能生血，患貧血症者。飲之頗宜。久服自能復原。

（蓮蓬）連殼置飯鍋上蒸熟剝食。能開胃增食慾。固腎氣。止遺洩。

（花紅）用好燒酒浸透食之。能治久痢。

（蘋菓）生食潤肺生津液。熟食有補腦之功。

（梨）切去柄蒂。挖去心。實以冰糖。仍將切下之柄蒂蓋好。置飯鍋上。蒸爛食之。治秋燥咳嗽。

（葡萄）滋腎水。補血液。養胃生津。強志安神。

（山查）可解酒消脹助胃之消化。灸灰末服。能止泄瀉。

★　★　★　★

治小兒雪口

姚原蓬

凡小兒之患雪口者。須用巴荳肉一粒。小膏藥一張。將巴荳肉置膏藥上打扁。貼小兒顖門上。約半日即愈。

（按）小兒雪口。係血液有溼熱壅滯而起。宜用清熱之藥。尤須通利大便。巴豆之氣善走。貼小兒顖門上。促血液之流行。以通局部之壅滯也。

兒科常識

急慢驚風之辨別（下）

張嘉卉

但急驚多用寒涼之藥，亦急則治標之意，若不急用清下，以致煩躁狂亂抽搐，目斜上視，幾瀕不救之勢矣，然清下太過，又易轉成慢驚等症，或多服鎮驚之藥，以致愈後成呆痼之疾，不知凡幾，是亦不可不知其弊也。所謂慢驚者，由于稟賦虛弱，脾虛肝竅，或由久瘧久痢，以及痘疹之後，或風寒飲食積滯，過用攻伐之劑，或由急驚過用峻利之藥，以致轉成，其因雖異，而傷其元氣卜一，症見面色淡白，四肢乍清，目暄口呆，小便清白，大便薄瀉，抽搐乍作乍止，時見驚跳，甚則腹中氣嚮，喉中痰鳴，角弓反張，目倦無神，脈沉渾散緩，舌苔白滑，當培補元氣為主，如逐寒蕩驚湯，醒脾救逆湯，緩肝理脾等法，因症施用，鮮有不效；然慢驚本無熱可言，但脾虛則熱內生，每多痰涎上泛，以致咽啾氣壅，氣急痰浮，身熱心煩，所謂體虛兼挾痰熱者，則又當清心滌痰之方矣，若遷延失治，面青額汗，眼合口噤，手足微搐，肢冷脈微，而成慢脾之症，則又深入一層，較為難治；或見冷汗淋漓，直臥如尸，喘咳頭軟，口噤頭搐，種種惡象，層見百出，今人妄以小兒為純陽之體，浪用寒涼之藥，釀成純陰之症，而速其死者，時有所聞，為深浩嘆。最可痛者，一知半解之流，見小兒熱甚口乾，不辨其為表邪，或為肺熱，及發痧之發熱，遂以回春太乙神犀之類，妄事亂投，常戈獲於萬一，豈知此藿丸散，不外麝香辛竄之品為主，如誤投之，往往引熱入腦，造成眞正驚風，於是神昏搐搦諸險症，又次第發見，馴至不可救藥。是為負有為父母之責者，為真正愛護子女計，切宜除此惡習。而為醫者，更不可不審慎從事，以適遭其咎也，故其診斷，當審虛實，別急慢而處方，始可漸入向愈之途，然急慢之分，大別之，乃急主熱而慢主寒，急屬實而慢屬虛，其搐搦則二症俱見，惟在緩急之分耳，故急驚則見壯熱面赤口渴種種之熱症，慢驚則見面清白肢冷脈緩等症，此急慢驚風症之大別也，